



INDIA

Conscious Care.

ZAGOR PASTA

Esca rodenticida in pasta fresca pronta all'uso, a base di brodifacoum, agisce su tutti i roditori anche se resistenti ad altri anticoagulanti.

Formulazione ad elevata sicurezza grazie all'inserimento del repellente denatonium benzoato

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 18466

Composizione, 100 g di formulato contengono:

Brodifacoum puro	g	0,005
Denatonium Benzoato	g	0,001
Zuccheri, grassi ed oli vegetali, farine, aromi, conservanti	q.b. a	g 100

Famiglia del principio attivo BRODIFACOUM	derivato idrossicumarinico
Modalità d'azione	per singola ingestione
Attività	svolge una specifica azione rodenticida per inibizione della vitamina K1 e conseguente alterazione nella coagulazione del sangue
Specie controllabili	ratto grigio, ratto dei tetti, topo domestico, topo selvatico, topo campagnolo

DENATONIUM BENZOATO, nome chimico	Benzyl-diethyl[(2,6 xylycarbonyl)methyl]ammonium benzoate
Modalità d'azione	per ingestione
Attività	svolge una specifica azione repellente rendendo le sostanze estremamente amare
Specie che non ne percepiscono la presenza sino a 0,001 g per 100 grammi di esca	ratto grigio, ratto dei tetti, topo domestico, ecc.

Formulazione

Nello ZAGOR PASTA il brodifacoum è formulato in bocconcini di pasta fresca (dal peso medio di 10 g) ottenuti mediante l'originale lavorazione di sostanze alimentari di alta qualità tra cui: farine, zuccheri, oli vegetali, grassi animali e vegetali e con l'aggiunta di sostanze aromatizzanti (aroma specifico: cioccolato) e conservanti (antiossidanti). L'esca è additivata con la sostanza amaricante **Denatonium Benzoato** (Bitrex). Tale sostanza la rende estremamente amara con la conseguenza di stimolare l'immediato rigetto, in caso di ingestione accidentale da parte di bambini o animali domestici. Caratteristica specifica del Denatonium Benzoato è quella di non essere percepita dal palato dei roditori sino a concentrazioni quali quella utilizzata in ZAGOR PASTA.

L'esca in pasta fresca è caratterizzata da una elevata appetibilità, dovuta all'elevato valore energetico ed alla particolare consistenza, è pertanto idonea alla lotta ai roditori in svariati ambienti anche se posta in competizione con fonti alternative di alimento.

Specie controllabili

ZAGOR PASTA è facilmente accettato e consumato da tutte le specie di roditori infestanti comunemente rinvenibili nei nostri ambiti: *Rattus norvegicus* (ratto grigio), *Rattus rattus* (ratto dei tetti), *Mus musculus* (topolino domestico), ecc.

**Proprietà e caratteristiche**

Il brodifacoum rappresenta il più recente tra gli anticoagulanti indiretti sviluppati come rodenticidi. Sua peculiare caratteristica è l'elevata tossicità acuta nei confronti degli animali bersaglio. Tale azione consente di ottenere la morte dei roditori anche a seguito di un'unica ingestione di una piccola quantità di esca.

Inoltre il brodifacoum si dimostra attivo anche nei confronti di ceppi di roditori divenuti resistenti agli altri anticoagulanti. Dalla comparazione tra i valori di tossicità acuta, nei confronti del topolino domestico, è possibile indicare il brodifacoum come due volte più efficace del difenacoum, tre più del difethialone e quattro volte rispetto al bromadiolone.

I roditori intossicati muoiono, come con gli altri anticoagulanti, senza sofferenze e pertanto non mettono in allarme gli altri individui che continuano ad assumere l'esca.

L'aggiunta del denatonium benzoato in ZAGOR PASTA rappresenta una innovazione volta all'aumento delle caratteristiche di sicurezza dell'esca.

Dosi e modalità di impiego

Disporre 2-6 bocconcini di ZAGOR PASTA negli appositi erogatori di sicurezza, o comunque avvalendosi di materiale in grado di occultare l'esca ed impedirne l'assunzione da parte di animali non bersaglio. L'esca deve essere collocata nei luoghi frequentati dai roditori, in particolare cercando di individuare i siti di alimentazione o, in alternativa, lungo i muri, sulle loro piste, in vicinanza delle tane, negli angoli e sotto cumuli di materiali accatastati. Verificare ogni 8-10 giorni la quantità di esca residua, se necessario completarla o rinnovarla del tutto. Gli eventuali roditori ritrovati morti devono essere bruciati o sotterrati per evitare fenomeni di avvelenamento secondario.

La presenza delle esche è bene venga segnalata con idonei cartelli di avviso riportanti le avvertenze del caso (divieto di manomettere le esche, principio attivo contenuto, antidoto specifico)

Classificazione del formulato

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.

Avvertenze

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare persone e animali, alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego.

L'antidoto specifico è rappresentato dalla vitamina K₁.

Confezione

ZAGOR PASTA è disponibile in cartone da 10 kg.